

Domande da fare allo specialista

Se hai segni e sintomi di emorroidi, è forse il momento di fissare un appuntamento con il tuo medico. Alcune domande da chiedere al tuo medico per capire meglio se la procedura THD® Doppler può essere adatta a te sono:


1. Qual è la causa probabile dei miei sintomi?
2. La mia patologia è temporanea o permanente?
3. Sono a rischio di complicanze associate a questa patologia?
4. Quale tipo di trattamento suggerisce? Perché?
5. Ci sono ulteriori tipi di automedicazione che possono essere di aiuto?

In base ai segni e ai sintomi, il tuo medico potrà consigliarti uno o più specialisti per il trattamento.



Chiama per un appuntamento

Per maggiori informazioni, chiama:



Scopri se il metodo THD® Doppler è adatto a te

I risultati e i tempi di recupero del paziente possono variare in base alla gravità della patologia.

Queste informazioni sono rilasciate a puro scopo educativo. Sono proposte per aiutarti a prendere una decisione consapevole rispetto a THD® Doppler come metodo per trattare le emorroidi.

Solo un medico può decidere se il metodo THD® Doppler è adatto a te.

METODO THD® DOPPLER

TRATTAMENTO MINI-INVASIVO DELLE EMORROIDI

THD360833A - 2020/09/07 - © THD S.p.A.

THD S.p.A.

Via Industria 1, 42015 Correggio (RE) Italy
Tel +39 0522 634 311 Fax +39 0522 634 371
www.thdlab.it




Cosa sono le emorroidi?

Le emorroidi sono un complesso di vasi sanguigni nell'ano e nella parte inferiore del retto. Pur facendo parte della nostra anatomia, nel tempo possono rigonfiarsi, causando prurito, sanguinamento e dolore. Il gonfiore delle emorroidi può essere causato da costipazione, gravidanza, ereditarietà, obesità e sforzi durante l'evacuazione, insieme ad altri fattori.

Ci sono due tipi di emorroidi:

- Le **emorroidi esterne** si trovano sul bordo anale esterno. Si sviluppano come soffici rigonfiamenti sotto a questo tessuto cutaneo particolarmente sensibile.
- Le **emorroidi interne** sono posizionate all'interno dell'ano e del retto e sono ricoperte dallo stesso sottile rivestimento del colon. Sebbene siano di solito indolore, possono infiammarsi e fuoriuscire dall'ano, causando irritazione e dolore.

Il sanguinamento può essere sintomo di problemi rettali più seri, come cancro o polipi. Qualsiasi forma di sanguinamento, anche lieve, deve essere valutata dal tuo medico.



Tipi di trattamento:

Per molte persone, le emorroidi si risolvono da sole grazie all'uso di farmaci da banco. Ogni volta che le procedure ambulatoriali o i trattamenti conservativi non sono ritenute efficaci, lo specialista può consigliare al paziente i trattamenti chirurgici.

Le attuali tipologie di trattamento includono:

Legatura elastica

La legatura elastica è un trattamento ambulatoriale usato nei primi stadi della malattia, quando i sintomi sono più evidenti. Un anello elastico viene posizionato sul tessuto esposto per ridurre l'iperafflusso di sangue; la procedura spesso deve essere ripetuta e le emorroidi possono ripresentarsi.

Stapling

Il tessuto in eccesso viene tagliato e il tessuto rimanente viene riposizionato nella sua sede originaria tramite delle graffette; la procedura è associata con un più alto tasso di complicanze e i tempi di recupero sono generalmente più lunghi rispetto alla legatura elastica.

Emorroidectomia

Sviluppata più di 50 anni fa, questa procedura chirurgica prevede la rimozione di un'ampia porzione di tessuto; i pazienti riferiscono intenso dolore e il recupero può richiedere diverse settimane.

Metodo THD® Doppler: un approccio alternativo mini-invasivo

Il **metodo THD® Doppler** è concepito per trattare le emorroidi dolorose, riducendo i problemi associati ad altri interventi. Non viene rimosso alcun tessuto. Il flusso sanguigno viene ridotto e le emorroidi vengono riposizionate nella loro sede naturale. La maggior parte dei pazienti riferisce minor dolore, tempi di recupero più rapidi e durata minore per le prime evacuazioni.

Il metodo THD® Doppler in 3 step:

La procedura THD® Doppler è spesso eseguita a livello ambulatoriale e consiste in 3 passaggi:

1. Attraverso la sonda Doppler si identificano le arterie che causano l'iperafflusso di sangue ai cuscinetti emorroidari.
2. Il chirurgo lega le arterie tramite una sutura riassorbibile, con conseguente riduzione di gonfiore e sanguinamento. Non sono previste resezioni né rimozioni di tessuto.
3. Il chirurgo riposiziona i tessuti prolassati nella loro sede originaria usando suture riassorbibili.

La procedura THD® Doppler:

- Non viene inciso né rimosso alcun tessuto.
- In molti casi i pazienti ritornano al lavoro o alle normali attività in una settimana.

Le informazioni riportate in questa brochure non devono sostituire il colloquio con il tuo medico. Fai sempre riferimento al tuo medico per risposte a domande relative a diagnosi e trattamenti.

Copyright © THD SpA. Tutti i diritti riservati.